



**CAPITAL
DIGESTIVE
CARESM**

First in Digestive Health

Maryland Digestive Disease Center

Jeffrey S. Garbis, M.D.

Jeffrey Bernstein, M.D.

Marvin E. Lawrence, II, M.D.

Priti Bijpuria, M.D.

Richard M. Chasen, M.D.

Theodore Y. Kim, M.D.

Sean M. Karp, M.D.

Instrucciones Para Colonoscopia Prep Kit

Instructions for COLONOSCOPY PREP KIT

Miralax (PEG 3350)/Magnesium Citrate/Dulcolax

Nombre Del Paciente: _____

Fecha: _____ **Hora Del Procedimiento:** _____

Con Doctor: _____

Ubicado: Ambulatory Endoscopy Center of Maryland

Laurel Regional Hospital

Washington Adventist Hospital

Howard County General Hospital

EL CONTENIDO DEL PREP KIT : 2 Bisacodyl tabletas, 1 (8.3 oz/238 g) botella de Miralax (generic PEG 3350) and 1 (10 oz) botella de Magnesium Citrate (no con sabor a cereza).

COMPRES: Una botella de 64 oz. o dos botellas de 32 oz. de Gatorade regular or G2 (No Rojo, No Azul ,No morado ni de polvo Gatorade).

Arreglos De Transporte: Para el día de su procedimiento se le va administrar un sedante y es obligatorio tener transportacion, debe ser acompañado por un adulto responsable por la razón que no va a poder conducir después de su procedimiento. El procedimiento será aproximadamente una hora y no es permitido usar transporte público solo/a (por ejemplo bus o taxi).

Siga los pre-requisitos de su procedimiento cuidadosamente para que este bien preparado/o

Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con nuestra oficina al **301-498-5500**.

Como llegar al Centro Ambulatorio de Endoscopia de MD: **7350 Van Dusen Road, Suite 230, Laurel, MD 20707** Tome I-95 hacia la salida 33A, ruta 198 hacia laurel, en la primera luz hacer una derecha, en la Van Dusen Rd., en la quinta luz haga una derecha. El edificio del medical arts pavillion, esta a su mano derecha, y repórtese al cuarto #230.

Dia De Su Cita M Tu W Th F	Fecha _____ Ahora _____	Capital Digestive Care, LLC Maryland Digestive Disease Center
7 Dias Antes De Su Procedimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Suspender los suplementos de fibra o medicamentos que contiene hierro, aspirina, advil, mortin, plavix, o medicamentos anticoagulantes. 	
5 Dias Antes De Su Procedimiento	<ul style="list-style-type: none"> • El paciente Debe seguir las indicaciones de su medico en respecto a su medicamentos. 	
3 Dias Antes De Su Procedimiento	Dejar de comer alimentos altos en fibra <ul style="list-style-type: none"> • Nueces • Maiz • Palomitas de Maiz • Frutas • Verduras • Salvado 	
1 Dia Antes De Su Procedimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Refrigere el Gatorade si desea beber frío • Beba de 6 a 8 vasos de agua durante el día • En la mañana, comience una dieta líquida y clara (sin alcohol o líquidos de rojos, azules o morados) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Café o Te (sin leche) ➤ Caldo o Consome ➤ Refrescos ➤ Juegos de frutas sin pulpa ➤ Gelatina ➤ Paletas o Caramelos duros • Entre las 16:00 y 18:00: Tomar 2 tabletas Bisacodyl • 1 hora después: Mezclar 1 botella de PEG3350 de 8.3oz (Generico de Miralax) con 64 oz. de Gatorade en una jarra grande. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Después Comienze a beber en un vaso de 8 oz. cada 15 minutos hasta que se termine el liquido. 	
El Dia De Su Procedimiento	4hora antes de su procedimiento Ahora: _____ <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se va a beber la botella de citrato de magnesia y despues va beber un vaso grande de agua y a continuacion, pare de beber liquidos claro. ➤ Tome todos los medicamentos de la manana a menos que su medico le indique de lo contrario. ➤ Si usted es asmatico, favor de traer su inhalador con usted el dia de su procedimiento. ➤ Si usted es incapaz de leer o comunicarse en el idioma ingles, por favor traiga un interprete con usted para traducir. 	

02/17/15 gg

Puede recibir un total de 4 afirmaciones; Centro de Endoscopia ambulatoria (servicios de facilidad), (2) Capital Digestive Care, Maryland Digestive Disease Care (servicios medicos) corredor anesthesia (servicios de anesthesia) (4) laboratorio/patologia si realice.

Por favor tenga en cuenta que hay una cuota de cancelacion de citas no cancelada dentro de las 48 horas.