

CLENPIQ 준비 지침
대장내시경 검사 또는 대장내시경 COLONOSCOPY/ EGD 검사용

환자: _____ 도착 요청 시간: _____ 날짜: _____
시술 진료 예약 담당 의사 _____

✓ 시술 5 일 전:

- 본 지침 서류를 전부 읽어 주시기 바랍니다.
- 처방대로 약국에서 준비 약품을 구입하십시오.
- 여러분을 집에 데려다 줄 사람과 약속을 잡으십시오. 모든 환자는 자신의 친구, 가족, 또는 간병인(18 세 이상)이 집까지 데려다 줄 수 있어야 합니다. 환자를 집에 데려다 줄 사람은 시술 예약 시간 한(1)시간 후에 병원에 도착해야 합니다.
- 오후 3:00 시 이후 예약이 잡힌 환자들의 경우, 데려다 줄 사람은 4:30 분까지 병원에 도착해야 합니다.
- 환자가 시술 예약 영업일 5 일 이내에 예약을 변경하거나 취소하는 경우, 취소 수수료 \$150.00 이 청구될 수 있습니다.

✓ 의약품

- 시술 5 일 전부터는 철분 보충제를 복용하지 마십시오.
- 아스피린, 당뇨병 약/인슐린, 혈액 응고 방지제(항응혈제), 심장 질환 약, 혈액 흐석제 복용은 시술 전 진료 방문 시에 담당 의사, 임상 간호사, 또는 보조 의사와의 논의하시기 바랍니다.
- 기타 약품은 모두 처방한 대로 시술 당일 아침 적어도 시술 3 시간 이상 전에 약간의 물과 함께 복용하시기 바랍니다.
- 의사의 지시 없이는 다른 약품 복용을 중단하지 마십시오.

✓ 시술 3 일 전:

- 시술 준비를 위해 식단을 조절하십시오. 시술 3 일 전부터는 씨앗, 퀴노아, 견과류, 콩류, 옥수수/팝콘, 생과일, 생야채 및 겨를 포함한 고섬유질 식품 섭취를 중단하시기 바랍니다.

✓ 시술 전날:

- 이 시술을 받는 사람은 시술 전날부터 다음 식단을 따라야 합니다. 담당 의사가 여러분이 따라야 하는 식단이 무엇인지를 알려드릴 것입니다.

맑은 유동식 식단 아침 점심 저녁

저잔류물 식단 아침 점심 저녁 - 오후 6 시 전

맑은 유동식에 허용되는 음식: 사과 주스, 흰 포도 및 흰 크랜베리 주스, 수프, 차, 커피(우유나 크림 없이), 젤로(미국식 젤리), 이탈리안 아이스, 빙과류, 소다수, 쿨에이드, 게토레이 및 물.

맑은 유동식은 시술 4 시간 전까지 계속 섭취 가능합니다.

맑은 유동식 식단에서 섭취할 수 없는 음식: 빨간색, 주황색 및 보라색 음료, 그리고 우유, 크림, 두유류, 조제 크리미, 과육이 포함된 주스(오렌지, 그레이프프루트, 파인애플, 토마토 및 V-8 주스 등). 맑은 유동식 식단에서는 고형식을 섭취할 수 없습니다.

저잔류물 식단에 허용되는 음식: 엔슈어(영양 보충 음료), 부스트(영양제), 달걀, 단백질 쉐이크, 플레인(덴마크 요거트) 또는 씨나 견과류가 포함되지 않은 조제/과일 요거트 본 식단을 따를 때는 이 외의 다른 음식을 섭취할 수 없습니다.

CLENPIQ 준비 지침 - 박스에 적힌 지침을 따르지 마십시오

✓ 시술 전날에는 다음 표를 따르시기 바랍니다.

첫 번째 복용분 - 파트 1 시술 전날 오후 4:00 시	비사코딜/둘코락스 2 정(5mg)을 물 한 잔(8 온스)과 함께 복용하십시오.
첫 번째 복용분 - 파트 2 시술 전날 오후 6:00 시	Clenpiq 1 병을 병째로 섭취하십시오. 그다음 동봉된 컵을 사용해 5 컵(각 8 온스씩)의 맑은 음료를 섭취하십시오. 이는 취침 3 시간 전까지 원하는 속도로 나눠서 섭취하시면 됩니다.

✓ 시술 6 시간 전에는 다음 표를 따르시기 바랍니다.

두 번째 복용분 시술 예약 시간 _____ 6 시간 전	Clenpiq 1 병을 병째로 섭취하십시오. 그런 다음 동봉된 컵을 사용해 3 컵(각 8 온스씩)의 맑은 음료를 섭취하십시오. 이는 취침 3 시간 전까지 원하는 속도로 나눠서 섭취하시면 됩니다.
시술 예약 시간 _____ 4 시간 전	시술 예약 시간 4 시간 전에는 섭취를 중단하시기 바랍니다.
추가 지침:	

✓ 예상할 사항:

- 1-3 시간 내에 지속적인 장 활동과 설사를 예상하시기 바랍니다. 인내심을 갖고 계속 걸어다녀 장 운동을 촉진해 주십시오. 계속 화장실 근처에 머무르시기 바랍니다.
- 일부 환자에게는 효과가 지연되어 나타날 수 있습니다. 첫 번째 복용분 섭취 3 시간 내에 장 활동이 없으면 사무실에 연락하시기 바랍니다.
- 준비 과정 막바지에는 투명하거나 노란 액체를 배설하게 됩니다.
- 투명하거나 노란 액체를 배설하는 중에도 두 번째 복용분을 반드시 섭취하셔야 합니다.
- 준비를 완전히 끝내지 않고 준비가 덜 된 환자의 시술은 취소되거나 예약을 다시 해야 할 수 있습니다.

✓ 준비 과정을 더 쉽게 도울 수 있는 것:

- 환자는 준비 과정 중 항문 자극을 방지하기 위해 Desitin, Anusol, Tucks 패드 또는 바세린을 사용해 항문 부위를 코팅할 수 있습니다.
- 용액은 빨대로 섭취하거나 코를 막고 마셔도 괜찮습니다.
- 속이 메스꺼우면 복용분 사이에 충분히 시간을 두고 천천히 섭취하시기 바랍니다.
- 시술 4 시간 전까지 계속 맑은 음료를 섭취할 수 있습니다. 시술 4 시간 전부터는 절대로 아무 것도 입으로 섭취해서는 안 됩니다. 물이나 씹는 껌 또한 금지됩니다. 이를 어기면 시술이 취소됩니다.

✓ 최종 체크 리스트:

- 의사가 천식용 흡입기를 처방한 경우, 이를 시술에 지참하시기 바랍니다.
- 혈압약, 파킨슨병 약, 발작 또는 천식 약품은 계속 복용하십시오. 해당 약품은 최소 시술 시작 3 시간 전에 약간의 물과 함께 복용하시기 바랍니다.
- 필요한 경우 사진이 포함된 신분증, 보험 카드, 공동 부담 비용을 지참하십시오.
- 귀중품과 보석은 집에 놔두고 편안한 옷을 착용하십시오.
- 시술 당일에는 향수나 로션을 사용하지 마십시오.

다음을 기재해 주십시오:

집에 데려다 줄 동반자: _____ 관계: _____

전화번호: _____

2_2019