

PEG 전해질(일반) 준비 키트 - 박스에 적힌 지침을 따르지 마십시오

√ 시술 전날에는 다음 표를 따르시기 바랍니다.

<p>첫 번째 복용분 - 파트 1 시술 전날 오후 4:00 시</p>	<p>비사코딜/둘코락스 2 정(5mg)을 물 한(1) 잔(8 온스)과 함께 복용하십시오. 그 다음 표시선까지 물을 부어 용액을 용기에서 혼합하십시오. 병 뚜껑을 닫고 병을 흔들어 파우더를 잘 녹이십시오. 용액은 맑고 무색이어야 합니다. 원하시면 용액을 냉장고에 넣어 차갑게 하시기 바랍니다.</p>
<p>첫 번째 복용분 - 파트 2 시술 전날 오후 6:00 시</p>	<p>용액의 반(8 잔)을 섭취하십시오. 30 분마다 한 번씩 용액 한 잔(각 8 온스)을 섭취하십시오. 각 잔은 원하는 속도대로 천천히 복용하십시오. 이때 “단숨에” 들이키지 마시기 바랍니다.</p>

√ 시술 6 시간 전에는 다음 표를 따르시기 바랍니다.

<p>두 번째 복용분 시술 예약 시간 _____ 6 시간 전</p>	<p>용액 4 잔(각 8 온스)을 섭취하십시오. 맑거나 노란 액체를 배설하고 있지 않는 경우 맑은 액체를 배설할 때까지 계속 30 분마다 한 번씩 한 잔(8 온스)을 섭취하십시오(최대 8 잔까지).</p>
<p>시술 예약 시간 _____ 4 시간 전</p>	<p>시술 예약 시간 4 시간 전에는 섭취를 중단하시기 바랍니다.</p>
<p>추가 지침:</p>	

√ 예상할 사항:

- 1-3 시간 내에 지속적인 장 활동과 설사를 예상하시기 바랍니다. 인내심을 갖고 계속 걸어다녀 장 운동을 촉진해 주십시오. 계속 화장실 근처에 머무르시기 바랍니다.
- 일부 환자에게는 효과가 지연되어 나타날 수 있습니다. 첫 번째 복용분 섭취 3 시간 내에 장 활동이 없으면 사무실에 연락하시기 바랍니다.
- 준비 과정 막바지에는 투명하거나 노란 액체를 배설하게 됩니다.
- 투명하거나 노란 액체를 배설하는 중에도 두 번째 복용분을 반드시 섭취하셔야 합니다.
- 준비를 완전히 끝내지 않고 준비가 덜 된 환자의 시술은 취소되거나 예약을 다시 해야 할 수 있습니다.

√ 준비 과정을 더 쉽게 도울 수 있는 것:

- 환자는 준비 과정 중 항문 자극을 방지하기 위해 Desitin, Anusol, Tucks 패드 또는 바세린을 사용해 항문 부위를 코팅할 수 있습니다.
- 더 쉬운 용액 섭취를 위해 용액을 냉장고에 넣어 차갑게 해도 좋습니다.
- 용액의 맛을 더 낮게 하기 위해 용액에 레몬맛 Crystal Lite 를 섞어도 괜찮습니다.
- 용액은 빨대로 섭취하거나 코를 막고 마셔도 괜찮으며, 속이 메스꺼우면 복용분을 나눠서 충분히 시간을 두고 천천히 섭취하시기 바랍니다.
- 시술 4 시간 전까지 계속 맑은 음료를 섭취할 수 있습니다. 시술 4 시간 전부터는 절대로 아무 것도 입으로 섭취해서는 안 됩니다. 물이나 씹는 껌 또한 금지됩니다. 이를 어기면 시술이 취소됩니다.

√ 최종 체크 리스트:

- 의사가 천식용 흡입기를 처방한 경우, 이를 시술에 지참하시기 바랍니다.
- **혈압약, 파킨슨병 약, 발작 또는 천식 약품은 계속 복용하십시오. 해당 약품은 최소 시술 시작 3 시간 전에 약간의 물과 함께 복용하시기 바랍니다.**
- 필요한 경우 사진이 포함된 신분증, 보험 카드, 공동 부담 비용을 지참하십시오.
- 귀중품과 보석은 집에 놔두고 편안한 옷을 착용하십시오.
- 시술 당일에는 향수나 로션을 사용하지 마십시오.

다음은 기재해 주십시오:

집에 데려다 줄 동반자: _____ 관계: _____

전화번호: _____