



Preparation Instructions for Breath Helicobacter Testing (H-Pylori) SPANISH

Instrucciones de preparación para la prueba de Helicobacter de aliento (H-Pylori Prep)

Nombre del paciente: _____

Fecha de cita: _____ Hora: _____

Ubicación: _____

1. No tome PPI's como Aciphex, Dexilant, Nexium, Prevacid OTC, Protonix, Zegerid, incluidos todos los formularios genéricos, durante (2) dos semanas antes de la prueba. Puede reiniciar estos medicamentos después de que se complete la prueba.

2. No tome H2 Blockers como Axid AR, Pepcid AC, Tagamet, Zantac, incluidos todos los analgésicos de acidez y acidez genéricos o de marca de la tienda durante (2) dos semanas antes de la prueba.

3. No use Enjuague bucal el día de la cita.

4. Debe ayunar durante (1) una hora antes de llegar a la cita. Esto incluye nada de comer, beber, fumar o masticar, incluyendo goma de mascar o mentas.

5. Si esta cita es posterior al tratamiento antibiótico prescrito para la infección por H-Pylori, la fecha de cita para volver a realizar la prueba debe ser (1) un mes después de terminar el antibiótico como Omeprazol, Prilosec, Prevacid u otro antibiótico prescrito.

Para hacer cambios a su cita o para contactar a nuestra oficina con preguntas.