



Jeffrey Garbis, M.D.	Richard Chasen, M.D.
Jeffrey Bernstein, M.D.	Theodore Kim, M.D.
Marvin Lawrence, II, M.D.	Sean Karp, M.D.
Priti Bijpuria, M.D.	Lauren Halvorson, M.D.
Darryn Potosky, M.D.	Eileen Erskine, C.R.N.P.

Instrucciones de preparación para pacientes con coagulación infrarroja de hemorroides (IRC)

Nombre del Paciente: _____

Fecha: _____ Hora de Llegada al procedimiento: _____

Con el Doctor: _____

Ubicación: **Oficina de Laurel** **Oficina de Columbia**

Para prepararse adecuadamente para su procedimiento, revise los requisitos previos al procedimiento en la hoja adjunta una semana antes de su examen y siga cuidadosamente las instrucciones.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra oficina al **301-498-5500**.

Si necesita reprogramar su procedimiento, necesitamos un aviso con al menos 48 horas de anticipación. Si nos informa el día de su procedimiento o si cancela su procedimiento con un aviso de menos de 48 horas, puede estar sujeto a un cargo por cancelación tarde de \$ 50.00

Oficina de Laurel:
7350 Van Dusen Road,
Suite 210
Laurel, MD 20707

Oficina de Columbia:
5500 Knoll North Drive,
Suite 460
Columbia, MD 21045

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN IRC/ coagulación infrarroja de hemorroides
CAPITAL DIGESTIVE CARE, LLC**

Día de la Cita:	L	M	M	J	V
Fecha: _____	Hora de Llegada: _____				

Información sobre su IRC/Coagulación Infrarroja/Radiación de hemorroides

La coagulación infrarroja/radiación es un procedimiento utilizado para el tratamiento de las hemorroides. El procedimiento involucra la aplicación de luz infrarroja/radiación a la base de la hemorroide, que coagula la hemorroide. Usualmente hay tres áreas diferentes dentro del recto donde ocurren las hemorroides, y se las conoce como complejos. Un área, o complejo, se trata en cada visita a la oficina. Aunque el paciente ocasionalmente sentirá un poco de calor, generalmente hay un dolor o molestia mínimos. El paciente puede regresar al trabajo el mismo día o al día siguiente. Ocasionalmente se producirá una pequeña hemorragia entre el cuarto y el décimo día después del tratamiento. El paciente regresa en aproximadamente 1 mes para el tratamiento de seguimiento.

Paso 1:

(5) Cinco días antes de su IRC/Coagulación infrarroja/radiación de hemorroides:

Fecha: _____

Compra (2) 4.5 fl. Onz. enemas

Notas: _____

Paso 2:

El día de su IRC/Coagulación infrarroja/radiación de hemorroides:

Fecha: _____

Una hora y media antes de su cita, tome el primer enema, sosténgalo durante 5 minutos y luego suéltelo en el inodoro. Repita inmediatamente con el segundo enema.

No coma nada después de haber tomado los 2 enemas

Siga las instrucciones provistas en el paquete del enema para conocer la técnica adecuada para la inserción del enema en el recto.

Notas:

Puede recibir un total de 4 declaraciones; (1) Centro de Endoscopia Ambulatoria de MD (centro), (2) Cuidado Digestivo de Capital (médico), (3) Anestesia de Corredor (anestesia) y (4) Patología Capital de Cuidado Digestivo (patología). 11/08/17 GG/RJ/DW