

Información importante antes del procedimiento

Revisar 1 semana antes de su procedimiento

Ubicación	<p>Capital Digestive Care Hygieacare® está ubicado en Shady Grove Professional Center II, 15001 Shady Grove Road, Rockville, Maryland 28050. Capital Digestive Care cuenta con muchas oficinas locales y centros de endoscopia, algunos de los cuales están muy cerca unos de otros. Utilice la hoja de consejos y planificación previa al procedimiento que se adjunta para llegar al lugar correcto y a la hora adecuada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los pacientes del centro de endoscopia deben llegar 45 minutos antes y los pacientes del hospital 1 hora antes para completar las actividades relacionadas con la ingesta previa al procedimiento.
Seguridad ante la COVID-19	<p>Todos los pacientes deben completar las pruebas de la COVID-19 en el plazo de 96 horas después de su procedimiento. Programaremos esta cita en el momento en que programemos su procedimiento.</p> <p>Los pacientes deben cumplir con todas las órdenes ejecutivas correspondientes y con las directivas estatales y locales sobre el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la circulación, principalmente entre el momento de la prueba de la COVID-19 y su procedimiento.</p> <p>El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados tendrá como resultado la cancelación de su procedimiento.</p>
Medicamentos	<p>Hable con su médico sobre cualquier medicamento o suplemento que tome habitualmente. No deje de tomar ningún medicamento recetado a menos que el médico que recetó el medicamento se lo indique.</p>
Contraindicaciones para HyGieaCare Prep	<ul style="list-style-type: none"> Insuficiencia cardíaca congestiva (clase III o IV de la New York Heart Association o fracción de eyección inferior al 50 %) Perforación intestinal Carcinoma del recto Fisuras o fístulas (especialmente en la enfermedad de Crohn) Hemorroides graves que no pueden ser reducidas hacia el interior del recto Hernia abdominal Insuficiencia renal (depuración de creatinina inferior a 60ml/min/1.73 m², este es el nivel que separa la disminución media de la función renal de la moderada a la grave) Cirugía de colon, rectal o abdominal reciente (menos de 30 días) Cirrosis (con ascitis) Embarazo

Políticas generales:

Transporte	<p>No se permite realizar algunas actividades, como conducir, en las horas posteriores a su procedimiento. Alguien que pueda asumir la responsabilidad de su cuidado (mayor de 18 años) debe llevarlo a su domicilio. Esta persona debe llegar inmediatamente 1 hora</p>
------------	--

Información importante antes del procedimiento

Revisar 1 semana antes de su procedimiento

	después de la hora de su procedimiento y a más tardar a las 4:30 p. m. No se permiten servicios de transporte como Uber, Lyft, servicio de taxi, etc.
Cancelación	Nuestro consultorio requiere una notificación de cancelación en el plazo de cinco (5) días hábiles; de lo contrario, se aplicará una tarifa de \$150.

Su preparación requiere las siguientes restricciones alimentarias: DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS

Esta preparación requiere que siga una dieta de líquidos claros el día antes de su procedimiento. Siga las instrucciones sobre cuándo comenzar y detener su preparación.

El incumplimiento de las instrucciones puede tener como resultado la cancelación de su procedimiento por su seguridad.

Lo que se permite en una dieta de líquidos claros*: agua, jugo de manzana, jugo de uva blanca y de arándanos blancos, caldo, té, café (sin leche, crema ni sustitutos); gelatina, barras de hielo, helados de agua, gaseosas, Kool-Aid, Gatorade. (*Ninguno de estos líquidos puede ser de color rojo, anaranjado o morado ni tener pulpa de frutas).

NO consuma:

- líquidos o productos de color rojo, anaranjado o morado;
- leche, crema o sustitutos no lácteos (como cremas artificiales, leche de soja o leche de frutos secos, como de almendras);
- jugos con pulpa (es decir jugo de naranja, toronja (pomelo), piña, tomate y jugo V-8) o productos de jugo congelado que tengan pulpa.
- alimentos sólidos.

√ 5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Este es el último día para cancelar su procedimiento sin incurrir en un cargo por cancelación tardía, según la política.
- Si tiene estreñimiento crónico, o ha tenido una mala o inadecuada preparación para la colonoscopia, póngase en contacto con la oficina de Hygieacare[®] al menos 5 días antes de su procedimiento programado, para discutir las instrucciones adicionales de preparación
- Si toma suplementos de hierro, debe interrumpirlos hasta después de su procedimiento.

√ 3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Ajuste su dieta. Deje de comer alimentos ricos en fibra, incluidos semillas y pipas, quinoa, frutos secos, frijoles, maíz/palomitas de maíz, frutas y verduras crudas y salvado.

√ 2 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Si no defeca con regularidad (diariamente), tome 2 comprimidos laxantes de bisacodilo de 5 mg a la hora de acostarse dos días antes del procedimiento.

Instrucciones de preparación para el procedimiento HygiPrep[®] con dieta de líquidos claros

EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO	
8:00 a. m.	Es importante que beba tantos líquidos claros como pueda durante el día para evitar la deshidratación.
Dieta de líquidos claros	<p>PERMITIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Líquidos: agua, jugo de manzana, jugo de uva blanca y de arándanos blancos, caldo, té, café (sin leche, crema ni sustitutos), gaseosas, Kool-Aid, Gatorade; • gelatina, barras de hielo, helados de agua. <p>NO CONSUMIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • líquidos o productos de color rojo, anaranjado o morado; • leche, crema o sustitutos no lácteos (como cremas artificiales, leche de soja o leche de frutos de secos, como de almendras); • jugos con pulpa (es decir jugo de naranja, toronja (pomelo), piña, tomate y jugo V-8) o productos de jugo congelado que tengan pulpa. • alimentos sólidos.
Instrucciones sobre la medicación	
A. Si el horario de los pacientes lo permite:	<p>a) Tomar 2 comprimidos laxantes de bisacodilo de 5 mg a las 10:00 a. m.</p> <p>b) Tomar 2 comprimidos laxantes de bisacodilo de 5 mg a la 1:00 p. m.</p>
B. Si el horario de los pacientes no lo permite:	<p>a) Tomar 2 comprimidos laxantes de bisacodilo de 5 mg a las 5:00 p. m.</p> <p>b) Tomar 2 comprimidos laxantes de bisacodilo de 5 mg a las 8:00 p. m.</p>
	Es importante que beba tantos líquidos claros como pueda durante el día para evitar la deshidratación.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO.	
8:00 a. m.	<p>Tomar 2 comprimidos laxantes de bisacodilo de 5 mg</p> <ul style="list-style-type: none"> • No consuma nada por vía oral 3 horas antes de la hora de su procedimiento. Consulte a continuación las excepciones de la medicación. SI COME O BEBE DENTRO DE ESTE PLAZO DE 3 HORAS, EL PROCEDIMIENTO PUEDE POSPONERSE O CANCELARSE.
Medicamentos	<ul style="list-style-type: none"> • Tome los medicamentos para la presión arterial, la enfermedad de Parkinson, las convulsiones o el asma. Tome estos medicamentos 3 horas o más antes de la hora de inicio del procedimiento con un solo sorbo pequeño de agua. • Si un médico le ha recetado un inhalador para el asma, llévelo al procedimiento.

**Instrucciones de preparación para el procedimiento
HygiPrep[®] con dieta de líquidos claros**

<p>Otras instrucciones</p>	<ul style="list-style-type: none">• Lleve su identificación con fotografía, tarjetas de seguro y copago, si es necesario.• Lleve puesta ropa cómoda. No lleve joyas ni lleve objetos de valor.• No use perfume ni lociones.
---------------------------------------	---

Fecha del procedimiento	
Hora del procedimiento	
Hora de llegada	
Nombre de la ubicación y dirección	
Nombre de la persona que lo lleva a su domicilio	
Relación	
Número de teléfono	