

시술 전 중요한 정보

시술을 시작하기 1주 전에 검토하십시오.

장소	<p>Capital Digestive Care Hygiacare®의 위치는 Shady Grove Professional Center II, 15001 Shady Grove Road, Rockville, Maryland 28050입니다. Capital Digestive Care에는 많은 지역 사무소와 내시경 검진 센터가 있으며, 그 중 일부는 서로 가까운 곳에 있습니다. 첨부된 시술 전 계획 및 팁 시트를 사용하여 적절한 장소와 시간에 도착할 수 있도록 준비하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 시술을 위한 섭취 활동을 완료하기 위해 내시경 검진 센터 환자는 45분 일찍, 병원 환자의 경우 1시간 일찍 도착해야 합니다.
COVID 안전	<p>모든 환자는 시술 전 96시간 이내에 COVID 검사를 완료해야 합니다. 시술 일정을 잡을 때 이 검사 일정을 예약해 드립니다.</p> <p>환자는 특히 COVID 검사와 시술 날짜 사이에 마스크 착용, 사회적 거리두기 및 여행에 관한 모든 해당 행정 명령과 주 및 지역 지침을 준수해야 합니다.</p> <p>위의 요구 사항 중 하나라도 충족하지 못하는 경우 시술이 취소됩니다.</p>
투약	<p>일상적으로 복용하는 약이나 보충제에 대해 담당 의사와 상의하십시오. 처방 의사의 지시가 없는 한 처방약 복용을 중단하지 마십시오.</p>
HyGieaCare 장정결에 대한 금기증	<ul style="list-style-type: none"> 울혈성 심부전(뉴욕심장학회 3등급 또는 4등급 또는 박출률 50% 미만) 장 천공 직장 암종 열창 또는 누공(특히 크론병에서) 직장 안으로 다시 감소할 수 없는 중증 치핵 복벽 탈장 신장 기능부전(크레아티닌 청소율 60ml/min/1.73m² 미만, 이는 중등증에서 중증의 신장 기능 저하 구간을 구분하는 수치임) 최근(30일 미만) 결장, 직장 또는 복부 수술 간경변증(복수 동반) 임신

일반 정책:

교통편	<p>운전과 같은 일부 활동은 시술 후 몇 시간 동안 허용되지 않습니다. 본인을 돌볼 수 있는 사람(만 18세 이상)의 차량을 타고 갈 수 있도록 준비하십시오. 시술 시간 1시간 후에 즉시 도착해야 하며, 늦어도 오후 4시 30분까지 도착해야 합니다. Uber, Lyft, 택시 서비스 등과 같은 교통 서비스는 허용되지 않습니다.</p>
취소	<p>저희 방침에 따라 영업일 기준 5일 이내에 취소 통지를 해야 하며, 그렇지 않으면 \$150의 수수료가 부과됩니다.</p>

시술 전 중요한 정보

시술을 시작하기 1주 전에 검토하십시오.

장정결 준비 과정에는 다음과 같은 식사 제한이 필요합니다. 맑은 유동식

이 장정결을 위해서는 시술 전날 맑은 유동식 절차를 따라야 합니다. 장정결 시작 및 중지 시기에 대한 지침을 따르십시오.

지침을 따르지 않으면 시술이 취소될 수 있으며, 이는 귀하의 안전을 위한 것입니다.

맑은 유동식에 허용되는 음식*: 물, 사과 주스, 백포도 및 화이트 크랜베리 주스, 죽, 차, 커피(우유, 크림 또는 대체물 제외). 젤로, 이탈리아 아이스, 아이스 캔디, 소다, 쿨에이드, 게토레이(*이중 어느 것도 빨간색, 주황색 또는 보라색이 아니거나 과육을 함유하지 않아야 함).

섭취 금지:

- 빨간색, 주황색 또는 자주색 액체 또는 식품.
- 우유, 크림 또는 유제품이 아닌 대체품(예: 인공 크림, 콩 또는 견과류 우유).
- 과육 함유 주스(예: 오렌지, 자몽, 파인애플, 토마토 및 V-8 주스) 또는 과육 함유 냉동 주스 제품.
- 고형식.

√ 시술 5일 전:

- 이 날은 방침에 따라 취소 지연 수수료 없이 귀하의 시술을 취소할 수 있는 마지막 날입니다.
- 만성 변비가 있거나 대장내시경검사 준비를 이전에 잘 하지 못했거나 불충분했던 경우, 예정된 시술 최소 5일 전에 Hygieacare® 사무실에 연락하여 추가 장정결 지침에 대해 상의하십시오.
- 철분 보충제를 복용하는 경우, 시술을 마칠 때까지 복용을 중단하십시오.

√ 시술 3일 전:

- 식단을 조절하십시오. 씨앗류, 퀴노아, 견과류, 콩, 옥수수/팝콘, 생과일, 채소 및 겨와 같은 고섬유질 음식을 섭취하지 마십시오.

√ 시술 2일 전:

- 규칙적인 일정(매일)으로 배변을 하지 않는 경우, 시술 2일 전 취침 시간에 Bisacodyl 5mg 설사약 정제 2정을 복용하십시오.

시술을 위한 장정결 지침 HygiPrep® 및 투명한 유동식

시술 전날		
오전 8시	탈수를 피하기 위해 낮 동안에 맑은 음료를 가능한 한 많이 마시는 것이 중요합니다.	
맑은 유동식	<p>허용:</p> <ul style="list-style-type: none"> 액체: 물, 사과 주스, 백포도 및 화이트 크랜베리 주스, 죽, 차, 커피(우유, 크림 또는 대체물 제외), 소다, 쿨에이드, 게토레이. 젤로, 이탈리아 아이스, 아이스 캔디. 	<p>섭취 금지</p> <ul style="list-style-type: none"> 빨간색, 주황색 또는 자주색 액체 또는 식품. 우유, 크림 또는 유제품이 아닌 대체품(예: 인공 크림, 콩 또는 견과류 우유). 과육 함유 주스(예: 오렌지, 자몽, 파인애플, 토마토 및 V-8 주스) 또는 과육 함유 냉동 주스 제품. 고형식.
투약 지침		
A. 환자 일정에 따라 허용되는 경우:	a) 오전 10시에 Bisacodyl 5mg 설사약 정제 2정을 복용하십시오 b) 오후 1시에 Bisacodyl 5mg 설사약 정제 2정을 복용하십시오	
B. 환자 일정에 따라 허용되지 않는 경우:	a) 오후 5시에 Bisacodyl 5mg 설사약 정제 2정을 복용하십시오 b) 오후 8시에 Bisacodyl 5mg 설사약 정제 2정을 복용하십시오	
	탈수를 피하기 위해 낮 동안에 맑은 음료를 가능한 한 많이 마시는 것이 중요합니다.	

시술 당일		
오전 8시	Bisacodyl 5mg 설사약 정제 2정을 복용하십시오 <ul style="list-style-type: none"> 시술 시간 3시간 전에는 아무것도 섭취하지 마십시오. 의약품 예외 사항은 아래를 참조하십시오. 이 3시간 이내에 음식을 먹거나 마시면 시술이 연기되거나 취소될 수 있습니다. 	
투약	<ul style="list-style-type: none"> 혈압, 파킨슨병, 발작 또는 천식 약물을 복용하십시오. 시술을 시작하기 3시간 이상 전에 소량의 물만 사용하여 이런 약물을 복용하십시오. 의사가 천식용 흡입제를 처방한 경우, 시술 시 이를 지참하십시오. 	
기타 지침	<ul style="list-style-type: none"> 요구되는 경우 사진이 부착된 신분증, 보험 카드, 코페이먼트 가입증을 지참하십시오. 편안한 옷을 입으십시오. 보석류를 착용하거나 귀중품을 가져 오지 마십시오. 향수나 로션을 바르지 마십시오. 	

시술 날짜	
시술 시간	
도착 시간	
장소명 및 주소	
집까지 차로 태워다 줄 사람의 이름	
관계	
전화번호	