

Su cita para el procedimiento es: _____ Favor de venir a: _____
Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos entre las 8:00 a.m. y 3:00 p.m.

Procedure Location: Silver Spring Rockville
10801 Lockwood Dr, Ste 110 15005 Shady Grove Rd, Ste 300
Silver Spring, MD 20901 Rockville, MD 20852
301 593 5110 301 762 1280

Debido a cancelaciones o emergencias médicas, la hora de su procedimiento puede cambiar. Se le llamará un día antes para confirmar las instrucciones. **TODO LO RELACIONADO CON SU PROCEDIMIENTO TOMARÁ ALREDEDOR DE 2 HORAS.**

POR FAVOR REVISE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE SIETE (7) DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO.

ACERCA DE SU PROCEDIMIENTO

Usted será sedado(a) con medicina intravenosa, y ésta impedirá su juicio y percepción. Después del procedimiento usted tendrá tiempo para descansar; sin embargo, usted tiene que **tener alguien que lo(a) lleve de regreso a casa** ya que los efectos de la medicina harán imposible que maneje un vehículo por 24 horas después del procedimiento. *Si estos arreglos no son hechos antes de venir al Centro, su procedimiento será cancelado.* **Al paciente no se le permitirá salir del Centro en taxi, sin que una persona adulta (mayor de 18 años) le acompañe.**

SIETE (7) DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

No tome **aspirina** (incluyendo Ecotrin, Bufferin, y Anacin), tampoco **hierro** o vitaminas que contengan hierro; tampoco suplementos herbales como Ginseng, Gingko y Ajo. Si usted toma Plavix, Coumadin, Heparin o Lovenox, consulte con su médico para saber cuando dejar de tomarlas.

CUATRO (4) DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

No tome **anti-inflamatorios** (e.g., ibuprofen, Advil, Motrin, Aleve, etc.). Sin embargo, Celebrex se pueden tomar hasta el día del procedimiento.

EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

Usted está permitido a comer su dieta regular. Si usted está tomando medicinas (prescritas o no) por cualquier razón, debe hablar con su médico para determinar si necesita dejar de tomarlas o no el día de su procedimiento. **Por favor tome todas las medicinas para la presión y para el corazón, incluyendo el día del procedimiento.**

Si usted es diabético(a) y toma glucophage, no la tome por 24 horas antes de su procedimiento. No tome ninguna otra medicina para la diabetes la mañana de su procedimiento. Si usted toma insulina, verifique con su doctor parar instrucciones específicas.

EL DÍA DE SU PROCEDIMIENTO

Comida sólida y productos lácteos no son permitidos. Usted puede tomar solamente líquidos claros **hasta cuatro horas antes** de su procedimiento. Líquidos claros incluyen jugos de manzana, uva, cranberry; caldos o sopas de cubitos, té y café (sin leche o crema), gelatina, helados italianos, sodas, Gatorade, Kool Aid y agua. Asegúrese que su jugo de naranja ,toronja o limonada, no contenga pulpa.

Durante las cuatro horas antes de su procedimiento, no tome ni coma nada, ni siquiera agua.

Por favor de no usar productos perfumados a su cita. Traiga a su cita, cualquier inhalador que este usando.