



**CAPITAL  
DIGESTIVE  
CARE<sup>SM</sup>**

*First in Digestive Health*

## **CLENPIQ CON DIETA LÍQUIDA CLARA PLANIFICACIÓN Y CONSEJOS PARA EL PROCEDIMIENTO**

(CLENPIQ WITH CLEAR LIQUID DIET PROCEDURE  
PLANNING & TIP SHEET)

### **SU INFORMACIÓN ADECUADA SOBRE EL PROCEDIMIENTO**

(YOUR PERTINENT PROCEDURE INFORMATION)

**Fecha del procedimiento:** \_\_\_\_\_ **Horario del procedimiento:** \_\_\_\_\_ **Horario de llegada:** \_\_\_\_\_  
(Procedure date) (Procedure time) (Arrival time)

**Nombre del lugar de la cita:** \_\_\_\_\_  
(Appointment location name)

**Dirección del lugar de la cita:** \_\_\_\_\_  
(Appointment location address)

**Nombre de la persona que  
proporciona el transporte a casa:** \_\_\_\_\_ **Relación:** \_\_\_\_\_  
(Name of person providing you a ride home) (Relationship)

**Número de teléfono:** \_\_\_\_\_  
(Phone number)

### **OTRAS INSTRUCCIONES**

- Traiga su identificación con fotografía, las tarjetas del seguro y el copago, si es necesario.
- Use ropa cómoda. No use joyas ni objetos de valor.
- No use perfumes ni lociones. El desodorante está permitido.

### **FORMAS DE FACILITAR LA PREPARACIÓN**

- Los pacientes pueden utilizar Desitin, Anusol, compresas Tucks o vaselina para cubrir la zona rectal y evitar la irritación durante la preparación.
- Los pacientes pueden beber la solución preparatoria con un sorbete o taparse la nariz al beber.
- Los pacientes deben beber más despacio entre las dosis si sienten náuseas.
- Los pacientes que vomiten la preparación deben hacer una pausa y continuar bebiéndola lentamente una vez que hayan pasado los vómitos.

### **QUÉ ESPERAR**

- Espere tener deposiciones frecuentes y diarrea dentro de las 1 a 4 horas. Tenga paciencia e intente caminar para estimular la actividad intestinal. Quédese cerca de un baño. Durante este tiempo, continúe su proceso de preparación.
- El líquido que expulse deberá ser claro o amarillo al finalizar la preparación.
- Debe completar todas las dosis de la preparación aunque elimine líquido claro o amarillo al principio del proceso.
- Los pacientes deben seguir bebiendo líquidos claros hasta 3 horas antes del procedimiento. Durante las 3 horas previas al procedimiento, no consuma nada por vía oral, ni siquiera agua, chicles o caramelos.
- Su procedimiento puede ser cancelado en las siguientes circunstancias: no finalizó por completo la preparación o la preparación fue inadecuada (no pasa el líquido claro o amarillo); consumir cualquier cosa por vía oral dentro de las 3 horas previas al procedimiento.

# CLENPIQ CON DIETA LÍQUIDA CLARA

## INFORMACIÓN UNA SEMANA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

### Para colonoscopia o colonoscopia/EGD

#### REVISE ESTA INFORMACIÓN 1 SEMANA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO



#### UBICACIÓN

Capital Digestive Care (CDC) tiene una gran cantidad de oficinas locales y centros de endoscopia. Algunas de nuestras sedes están muy cerca unas de otras.

- A los pacientes del centro de endoscopia se les puede pedir que lleguen entre 45 a 60 minutos antes para completar las actividades de admisión.
- A los pacientes hospitalizados se les puede pedir que lleguen 1 a 2 horas antes para completar las actividades de admisión.

Revise los avisos de recordatorio de sus citas para conocer la hora exacta de llegada.



#### MEDICAMENTOS

Hable con su médico sobre cualquier medicamento o suplemento que tome habitualmente. No deje de tomar los medicamentos recetados a menos que se lo indique su médico.



#### TRANSPORTE

Algunas actividades, como conducir, no están permitidas hasta el día siguiente al procedimiento. Consiga que le lleve alguien que pueda responsabilizarse de su cuidado (mayor de 18 años). Pídale que estacionen y entren en el centro para acompañarle fuera del edificio. Deben llegar como máximo una hora después del procedimiento. Si su cita es después de las 3:00 horas, su transporte deberá llegar como muy tarde a las 4:30 horas. No se permiten servicios de transporte como Uber, Lyft, servicio de taxi, etc.



#### CANCELACIÓN

Nuestra práctica requiere la notificación de la cancelación dentro de una (1) semana, de lo contrario, se aplicará un cargo de 150 dólares.

# CLENPIQ CON DIETA LÍQUIDA CLARA

## INFORMACIÓN UNA SEMANA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

### Para colonoscopia o colonoscopia/EGD



### 5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

#### FARMACIA

##### Recoja los siguientes suministros:

- Su receta de solución preparatoria en la farmacia.
- Cómprela por separado sin receta: 2 comprimidos de laxante bisacodilo.
- Si lo desea: artículos de venta libre para aliviar la irritación rectal, que puede aparecer durante la preparación. Por ejemplo, Desitin, Anusol, compresas Tucks o vaselina.

#### NO SE PERMITE

- Si toma suplementos de hierro, deje de tomarlos hasta después del procedimiento.
- Si toma fentermina, deje de tomarla hasta después del procedimiento.



### 3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

#### Ajuste su dieta



Deje de comer alimentos ricos en fibra, como semillas, quinoa, frutos secos, judías, maíz/palomitas, frutas crudas, verduras crudas y salvado. Revise la hoja de planificación y los consejos previos al procedimiento para saber qué esperar y los consejos para facilitar la preparación.



### 1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

Esta preparación requiere que siga una dieta líquida clara al despertarse el día anterior al procedimiento. Siga las instrucciones sobre cuándo empezar y cuándo parar de ingerir la preparación. **El incumplimiento de las instrucciones puede dar lugar a la cancelación de su procedimiento - esto es por su seguridad.**

#### CONSUMIR SOLO LÍQUIDOS CLAROS

Al despertar, es importante beber tantos líquidos claros como sea posible a lo largo del día para evitar la deshidratación durante la preparación vespertina.

#### PERMITIDOS

- Agua, jugo de manzana, jugo de uva blanca y arándano blanco, caldo, té, café (sin leche, cremas ni sustitutos)
- Gelatina, helados italianos, paletas, refrescos, Kool -Aid, Gatorade

\*Ninguno de ellos puede ser de color rojo, naranja o morado, ni contener pulpa de fruta.

#### NO SE PERMITE

- Líquidos o productos de color rojo, naranja o morado
- Leche, crema o sustitutos no lácteos (como cremas artificiales, leches de soja o de frutos secos)
- Jugos que contengan pulpa (por ejemplo, naranja, toronja, piña, tomate y Jugo V-8) o productos de jugo congelados que contengan pulpa
- Bebidas alcohólicas
- Alimentos sólidos

# CLENPIQ CON DIETA LÍQUIDA CLARA

## INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN | NOCHE ANTERIOR/ESE DÍA

### Para colonoscopia o colonoscopia/EGD

#### DE 4 A 6 DE LA TARDE DEL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO: PRIMERA DOSIS PARTE 1



##### PASO 1

Tome 2 comprimidos laxantes de bisacodilo 5 mg con un vaso de agua o líquido claro de 8 onzas.

#### UNA HORA MÁS TARDE: PRIMERA DOSIS PARTE 2

### NO SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA CAJA DE CLENPIQ

En su lugar, siga estas instrucciones:



##### PASO 1

Beba una botella de CLENPIQ directamente de la botella.



##### PASO 2

Durante las horas siguientes, beba cinco tragos de 8 onzas de líquido claro utilizando el vaso adjunto. Puede beber a su ritmo.

#### CINCO (5) HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO: SEGUNDA DOSIS



##### PASO 1

Beba una botella de CLENPIQ directamente de la botella.



##### PASO 2

Durante las siguientes 1-2 horas, beba cuatro tragos de 8 onzas de líquido claro utilizando el vaso adjunto.



- Debe terminar 3 horas antes del procedimiento
- No consuma nada por vía oral 3 horas antes del procedimiento. Consulte a continuación las excepciones relativas a la medicación.

**SI BEBE DENTRO DE ESTE PLAZO DE 3 HORAS, EL PROCEDIMIENTO PUEDE POSPONERSE O CANCELARSE.**

### MEDICAMENTOS

- Tome sus medicamentos como la aspirina, presión arterial, Parkinson, convulsiones o medicamentos de asma . Tome estos medicamentos 3 o más horas antes de la hora de inicio del procedimiento con sólo un pequeño sorbo de agua.
- Si un médico le ha recetado un inhalador para el asma, tráigalo al procedimiento.
- Algunos medicamentos como anticoagulantes, ciertos medicamentos para la diabetes o para bajar de peso, incluyendo inyecciones: GLP-1, Ozempic, Wegovy, y otros medicamentos para bajar de peso, pueden suspenderse temporalmente antes del procedimiento.

370Q12025