



상부 위장관 내시경 검사(EGD) 검사 계획 및 팁 시트 (ESOPHAGOGASTRODUODENOSCOPY (EGD) PROCEDURE PLANNING & TIP SHEET)

관련 검사 정보

(YOUR PERTINENT PROCEDURE INFORMATION)

검사 날짜: _____
(Procedure date)

검사 시간: _____
(Procedure time)

도착 시간: _____
(Arrival time)

예약 장소 명: _____
(Appointment location name)

예약 장소 주소: _____
(Appointment location address)

귀가 교통편
제공자 명: _____
(Name of person providing you a ride home)

관계: _____
(Relationship)

전화번호: _____
(Phone number)

기타 지침

- 필요한 경우 사진이 부착된 신분증, 보험증 및 본인 부담금을 지참하십시오.
- 편안한 옷을 입으십시오. 장신구를 착용하거나 귀중품을 가져오지 마십시오.
- 향수나 로션을 바르지 마십시오. 탈취제는 허용됩니다.

준비 용액 복용 후 진행되는 과정

- 서면 프렙 지침을 준수하지 못했거나 검사 전 3시간 동안 무엇인가 섭취한 경우 검사가 취소될 수 있습니다.

검사 1주일 전에 검토하십시오



위치

캐피탈 다이제스티브 케어(CDC)에는 많은 현지 사무소와 내시경 센터가 있습니다. 일부 지점은 서로 매우 가깝습니다.

- 내시경 센터 환자는 접수 절차 과정을 완료하기 위해 45~60분 일찍 도착해야 합니다.
- 병원 환자는 접수 절차 과정을 완료하기 위해 1~2시간 일찍 도착해야 합니다.

정확한 도착 시간을 확인하려면 예약 알림을 검토하십시오.



약물 복용

정기적으로 복용하는 약이나 보충제에 대해 의사와 상담하십시오. 처방 의사의 지시가 없는 한 처방약을 중단하지 마십시오.



교통

운전과 같은 일부 활동은 검사 다음 날까지 허용되지 않습니다. 환자를 책임질 수 있는 사람(18세 이상)에게 운전을 부탁하십시오. 주차하고 검사 센터에 들어가 건물 밖으로 안내해 달라고 요청하십시오. 검사 후 1시간 이내에 도착해야 합니다. 예약이 오후 3시 이후인 경우 운전자는 오후 4시 30분 이전에 도착해야 합니다. Uber, Lyft, 택시 서비스 등과 같은 차량 서비스 이용은 허용되지 않습니다.



취소

1주일 이내에 검사 센터에 취소를 통지해야 하며, 그렇지 않을 경우 150달러의 수수료가 부과됩니다.

상부 위장관 내시경 검사(EGD)

검사 전 정보

EGD의 경우

저녁 식사: 검사 전날

Wegovy, Ozempic 또는 Mounjaro를 복용하는 경우 검사 전날 저녁에 맑은 액체 식단의 저녁 식사를 해야 합니다.

검사 전날 오후 11시

- 환자는 검사 전날 밤 11시 이후에는 고형 식품을 섭취할 수 없습니다.
- 오후 11시부터 검사 3시간 전까지는 맑은 액체만 마셔야 합니다.

- 검사 3시간 전까지 마셔야 합니다.
- 검사 3시간 전에는 아무 것도 섭취하지 마십시오. 약물 복용 예외 사항은 아래를 참조하십시오.
검사 3시간 이내에 음료를 마시면 검사가 연기되거나 취소될 수 있습니다.

오후 11시부터 검사 3시간 전까지

섭취 불가

- 빨간색, 주황색 또는 자주색 액체나 제품.
- 우유, 크림 또는 유제품이 아닌 대체품(예: 인공 크림, 두유 또는 견과류 우유).
- 펄프가 포함된 주스(예: 오렌지, 자몽, 파인애플, 토마토 및 V-8 주스) 또는 펄프가 포함된 냉동 주스 상품.
- 알코올 음료.
- 고형 식품.

검사 전날과 오후 11시 이후, 검사 3시간 전까지 섭취 가능

- 물, 사과 주스, 백포도 및 흰색 크랜베리 주스, 육수, 차, 커피(우유, 크리머 또는 대용품 제외).
 - 젤로, 이탈리안 아이스, 아이스 캔디, 소다, 쿨에이드, 게토레이.
- *이들 음료는 빨간색, 주황색 또는 자주색이면 안 되며 과일 펄프를 포함할 수 없습니다.

약물 복용

- 아스피린, 혈압, 파킨슨병, 발작 또는 천식 치료제와 같은 약물은 복용하십시오. 이러한 약물은 검사 시작 3시간 전까지 소량의 물만 마시면서 복용하십시오.
- 의사가 천식 흡입기를 처방한 경우 검사 시 지참하십시오.

372Q42023