

## SU INFORMACIÓN ADECUADA SOBRE EL PROCEDIMIENTO

(YOUR PERTINENT PROCEDURE INFORMATION)

**Fecha del procedimiento:** \_\_\_\_\_ **Horario del procedimiento:** \_\_\_\_\_ **Horario de llegada:** \_\_\_\_\_  
(Procedure date) (Procedure time) (Arrival time)

**Nombre del lugar de la cita:** \_\_\_\_\_ **Dirección del lugar de la cita:** \_\_\_\_\_  
(Appointment location name) (Appointment location address)

**Nombre de la persona que proporciona el transporte a casa:** \_\_\_\_\_ **Relación:** \_\_\_\_\_  
(Name of person providing you a ride home) (Relationship)

**Número de teléfono:** \_\_\_\_\_  
(Phone number)

## OTRAS INSTRUCCIONES

- Traiga su identificación con fotografía, las tarjetas del seguro y el copago, si es necesario.
- Use ropa cómoda. No use joyas ni objetos de valor.
- No use perfumes ni lociones. El desodorante está permitido.

## QUÉ ESPERAR

- Su procedimiento puede ser cancelado en las siguientes circunstancias: no siguió las instrucciones de preparación escritas o consumir cualquier cosa por vía oral en las 3 horas siguientes al procedimiento.

## REVISE ESTA INFORMACIÓN 1 SEMANA ANTES DE SU

### PROCEDIMIENTO UBICACIÓN

Capital Digestive Care (CDC) tiene una gran cantidad de oficinas locales y centros de endoscopia. Algunas de nuestras sedes están muy cerca unas de otras.

- A los pacientes del centro de endoscopia se les puede pedir que lleguen entre 45 a 60 minutos antes para completar las actividades de admisión.
- A los pacientes hospitalizados se les puede pedir que lleguen 1 a 2 horas antes para completar las actividades de admisión. Revise los avisos de recordatorio de sus citas para conocer la hora exacta de llegada.



### MEDICAMENTOS

Hable con su médico sobre cualquier medicamento o suplemento que tome habitualmente. No deje de tomar los medicamentos recetados a menos que se lo indique su médico.



### TRANSPORTE

Algunas actividades, como conducir, no están permitidas hasta el día siguiente al procedimiento. Consiga que le lleve alguien que pueda responsabilizarse de su cuidado (mayor de 18 años). Pídeles que estacionen y entren en el centro para acompañarle fuera del edificio. Deben llegar como máximo una hora después del procedimiento. Si su cita es después de las 3:00 horas, su transporte deberá llegar como muy tarde a las 4:30 horas. No se permiten servicios de transporte como Uber, Lyft, servicio de taxi, etc.



### CANCELACIÓN

Nuestra práctica requiere la notificación de la cancelación dentro de una (1) semana, de lo contrario, se aplicará un cargo de 150 dólares.



# ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) INFORMACIÓN PREVIA AL PROCEDIMIENTO de EGD



## CENA: DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO

Si se le administra Wegovy, Ozempic o Mounjaro debe cenar una dieta líquida clara la noche anterior al procedimiento.



## 11:00 PM DE LA NOCHE DEL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO

- Los pacientes no pueden ingerir alimentos sólidos después de las 11:00 horas de la noche anterior al procedimiento.
- Solo deben beber líquidos claros desde las 11:00 de la noche anterior hasta 3 horas antes del procedimiento



- No consuma nada por vía oral 3 horas antes del procedimiento. Consulte a continuación las excepciones relativas a la medicación.

**SI BEBE DENTRO DE ESTE PLAZO DE 3 HORAS, EL PROCEDIMIENTO PUEDE POSPONERSE O CANCELARSE.**

### NO PERMITIDOS ENTRE LAS 11:00 DE LA NOCHE DEL DÍA ANTERIOR Y LAS 3 HORAS ANTERIORES AL PROCEDIMIENTO

- Líquidos o productos de color rojo, naranja o morado
- Leche, crema o sustitutos no lácteos (como cremas artificiales, leches de soja o de frutos secos)
- Jugos que contengan pulpa (por ejemplo, naranja, pomelo, piña, tomate y jugo V-8) o jugos congelados que contengan pulpa
- Bebidas alcohólicas
- Alimentos sólidos

### PERMITIDO EL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO Y DESPUÉS DE LAS 11:00 HORAS DE LA NOCHE ANTERIOR Y HASTA 3 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Agua, jugo de manzana, jugo de uva blanca y arándano blanco, caldo, té, café (sin leche, cremas ni sustitutos)
  - Gelatina, helados italianos, paletas, refrescos, Kool-Aid, Gatorade
- \*Ninguno de ellos puede ser de color rojo, naranja o morado, ni contener pulpa de fruta.

## MEDICAMENTOS

- Tome sus medicamentos como la aspirina, presión arterial, Parkinson, convulsiones o medicamentos de asma . Tome estos medicamentos 3 o más horas antes de la hora de inicio del procedimiento con sólo un pequeño sorbo de agua.
- Si un médico le ha recetado un inhalador para el asma, tráigalo al procedimiento.
- Algunos medicamentos como anticoagulantes, ciertos medicamentos para la diabetes o para bajar de peso, incluyendo inyecciones: GLP-1, Ozempic, Wegovy, y otros medicamentos para bajar de peso, pueden suspenderse temporalmente antes del procedimiento.